



MAT182 PVK

## Aufgabensammlung

### Vektorgeometrie

# Vektorgeometrie-Aufgaben

## Rep-HS20 (Sept. 2021) - Aufgabe 2:

- a) Die Punkte  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(0, 1, 0)$  und  $C(2, 3, 4)$  seien Punkte eines Dreiecks. Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks und ergänzen Sie das Dreieck zu einem Parallelogramm.
- b) Untersuchen Sie, ob der Punkt  $E(3, 4, 5)$  in der Ebene des Dreiecks liegt: wenn ja: beweisen Sie es, wenn nein, widerlegen Sie es.

Lösung:

- a)  $\sqrt{202}$ ,  $D(2, 4, 4)$  oder  $D(2, 2, 4)$  oder  $D(-2, -2, -4)$   
b) Nein ( $\vec{OE} = \vec{OA} + \lambda\vec{AB} + \mu\vec{AC}$  hat  $\mu = 1.5 \neq \mu = 1.25$ )

## HS20 - Aufgabe 2: (Version A)

- a) Wie lautet die Gleichung der Ebene  $E$ , die durch  $A(0, 0, 0)$  und  $B(1, 2, 1)$  geht und senkrecht zu  $\vec{n} = (3, 2, u)$  steht (nicht die Parameterdarstellung!)?
- b) Wie lautet die Schnittgerade  $g$  der Ebene  $E$  mit der  $xy$ -Ebene in Parameterdarstellung?

Lösung:

- a)  $3x + 2y - 7z = 0$    b)  $g : (0, 0, 0) + t \cdot (2, -3, 0), t \in \mathbb{R}$

## Rep-HS19 (Aug. 2020) - Aufgabe 2:

- a) Gegeben seien die drei Punkte  $A(4, -5, 106)$ ,  $B(-4, -13, 92)$  und  $C(-6, 3, 84)$ . Zeigen Sie, dass es sich dabei um 3 Ecken eines Quadrats handeln könnte. Tipp: Dazu müssen Sie *zwei* Eigenschaften überprüfen.
- b) Berechnen Sie noch den vierten Punkt  $D$ .
- c) Wir wollen das Quadrat  $ABCD$  noch zu einem Würfel ergänzen. Berechnen Sie den Punkt  $E$ , der eine Kantenlänge von  $A$  entfernt ist (es gibt 2 Lösungen - wir wollen beide sehen). Die weiteren Punkte müssen nicht berechnet werden.

Lösung:

- a)  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 18$  und  $\vec{a} \bullet \vec{b} = 0$   
b)  $D(2, 11, 98)$  (Punkt-Bezeichnung fix!)  
im Gegenuhrzeigersinn:  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$   
c)  $A \pm (16, -2, -8) \rightarrow E_1(20, -7, 98), E_2(-12, -3, 114)$

## HS19 - Aufgabe 2:

- a) Wie lautet die Gleichung der Ebene  $E$ , die durch  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(1, 2, 3)$ ,  $C(4, 5, 6)$  geht (nicht die Parameterdarstellung!)?
- b) Wie gross ist die Fläche des Dreiecks  $ABC$ ?
- c) Wie lautet die Schnittgerade der Ebene  $E$  mit der  $xy$ -Ebene in Parameterdarstellung?

Lösung:

- a)  $-3x + 6y - 3z = 0$    b)  $\sqrt{54}/2$   
c)  $(0, 0, 0) + s \cdot (-2, -1, 0), s \in \mathbb{R}$

**Rep-HS18 - Aufgabe 2:**

Der Vektor  $\vec{a}$  habe Richtung  $\vec{r} = (0, 1, 2)$ . Zusammen mit dem Vektor  $\vec{b} = (1, 2, 3)$  und dem Ursprung  $O$  definiert er ein Dreieck  $OAB$ :  $A$  sei im Endpunkt von  $\vec{a}$ , wenn dieser in  $O$  ansetzt; analog  $B$ . Wie lange muss  $\vec{a}$  sein, damit das Dreieck die Fläche 1 hat? Man kann mangels Taschenrechner die Formel stehen lassen.

**Lösung:**

$$|\vec{a}| = \sqrt{\frac{10}{3}}$$

**HS18 - Aufgabe 1b)**

Gegeben seien zwei Vektoren  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$ , beide nicht der Nullvektor und senkrecht zueinander. Kann es sein, dass das Kreuzprodukt  $\vec{a} \times \vec{b}$  gleich  $\vec{0}$  ist? Wenn ja, Beispiel; wenn nein: Grund.

**Lösung:**Nein, denn die Länge des Kreuzprodukts ist  $|\vec{a}||\vec{b}| \neq 0$ **HS18 - Aufgabe 2:**

Von einem Dreieck  $ABC$  sei gegeben  $A(0, 0)$ ,  $B(1, 0)$  und  $C(x, 1)$ . Bestimmen Sie mit Beweis  $x$  so, dass die Summe der quadrierten Seitenlängen minimal wird.

**Lösung:**

$$x = 0.5$$

**Rep-HS17 - Aufgabe 2:**

- Gegeben seien 3 Vektoren  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  und  $\vec{c}$ . Wenn  $\vec{a}$  senkrecht auf  $\vec{b}$  steht und  $\vec{b}$  senkrecht auf  $\vec{c}$ , folgt daraus, dass auch  $\vec{a}$  senkrecht auf  $\vec{c}$  steht? Falls ja: Beweis; Falls nein: Gegenbeispiel.
- Von einem Quadrat  $ABCD$  kennt man die beiden ersten Punkte vollständig:  $A(5, 4, -3)$ ,  $B(-2, 8, 1)$ ; vom dritten Punkt unvollständig  $C(2, ?, 0)$ . Berechnen Sie  $C$  und  $D$  vollständig. Gibt es nur eine Lösung?

**Lösung:**a) Nein! (wähle z.B.  $\vec{c} = k \cdot \vec{a}$ ) b) Ja,  $C(2, 16, 0)$ ,  $D(9, 12, -4)$ **HS17 - Aufgabe 2:**

- Gegeben seien neben Ursprung  $O(0, 0, 0)$  auch die Punkte  $A(1, 1, 1)$  und  $B(0, 2, 0)$ . Berechnen Sie den Winkel zwischen den Vektoren  $\vec{OA}$  und  $\vec{OB}$ . Ausdrücke in trigonometrischen Funktionen oder deren Umkehrfunktionen kann man stehen lassen.
- Berechnen Sie die Fläche des Dreiecks  $OAB$ .

**Lösung:**

a)  $\varphi = \arccos(1/\sqrt{3})$  b)  $\sqrt{8}/2 = \sqrt{2}$

**HS16 - Aufgabe 2:**

- a) Geben Sie alle Punkte  $P$  in der  $xy$ -Ebene auf der Geraden  $x = 0.5$  an, von denen aus die beiden Punkte  $A(0,0,0)$  und  $B(1,0,0)$  unter einem Winkel von 90 Grad gesehen werden (geometrische Anschauung reicht nicht; mit Rechnung mit Skalarprodukt bitte).
- b) Geben Sie alle Punkte  $P$  in der  $xy$ -Ebene an, von denen aus die beiden Punkte  $A(0,0,0)$  und  $B(1,0,0)$  unter einem Winkel von 90 Grad gesehen werden (geometrische Anschauung reicht nicht - **hilft aber am Schluss bei der Umformung**; mit Rechnung mit Skalarprodukt bitte). Prüfen Sie am Schluss bitte, ob wirklich alle Punkte aus der Rechnung in Frage kommen und beschreiben Sie die Menge der Punkte.
- c) Geben Sie alle Punkte  $P$  im Raum an, von denen aus die beiden Punkte  $A(0,0,0)$  und  $B(1,0,0)$  unter einem Winkel von 90 Grad gesehen werden (geometrische Anschauung reicht nicht; mit Rechnung mit Skalarprodukt bitte). Prüfen Sie am Schluss bitte, ob wirklich alle Punkte aus der Rechnung in Frage kommen und beschreiben Sie die Menge der Punkte.

**Lösung:** a)  $(1/2, 1/2, 0)$  und  $(1/2, -1/2, 0)$  b) Kreis mit  $r = 0.5$  und  $M = (0.5, 0)$  c) Kugel mit  $r = 0.5$  und  $M = (0.5, 0, 0)$

**Rep-HS15 - Aufgabe 1h) :**

Die Vektoren  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  seien definiert als  $\vec{e}_1 := (5, 0, 0)$  und  $\vec{e}_2 := (0, 2, 3)$ . Welchen Vektor erhält man, wenn man das Kreuzprodukt von  $\vec{e}_1$  und  $\vec{e}_2$  bildet und den resultierenden Vektor noch um den Faktor 3 streckt?

**Lösung:**  $(0 \quad -45 \quad 30)$

**Rep-HS15 (Sept. 2016) - Aufgabe 1h)**

Die Vektoren  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  seien definiert als  $\vec{e}_1 := (5, 0, 0)$  und  $\vec{e}_2 := (0, 2, 3)$ . Welchen Vektor erhält man, wenn man das Kreuzprodukt von  $\vec{e}_1$  und  $\vec{e}_2$  bildet und den resultierenden Vektor noch um den Faktor 3 streckt?

**Lösung:**  $(0, -45, 30)^t$

**Rep-HS15 - Aufgabe 2 :**

a) Berechnen Sie die Fläche des Dreiecks mit den Eckpunkten  $(0,0,1)$ ,  $(0,1,0)$ ,  $(0,0,3)$ .

b) Geben Sie die Cosinus' der drei Winkel des Dreiecks an (kürzen soweit möglich).

**Lösung:** a) 1 b) in  $(0,0,1)$ :  $\cos(\alpha) = \frac{-\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$   
in  $(0,1,0)$ :  $\cos(\beta) = \frac{4}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$  in  $(0,0,3)$ :  $\cos(\gamma) = \frac{3}{\sqrt{10}}$

**HS15 - Aufgabe 1b)**

Sie haben 2 Vektoren  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$ . Beschreiben Sie in natürlicher Sprache, in welchen Fällen das Skalarprodukt 0 ist.

**Lösung:** wenn  $\vec{a}$  oder  $\vec{b}$  Nullvektoren sind; Oder  $\vec{a} \perp \vec{b}$  (senkrecht)

**HS15 - Aufgabe 1c)**

Folgt aus  $\vec{a}\vec{b} = \vec{a}\vec{c}$  dass auch  $\vec{b} = \vec{c}$ ? Wenn ja, beweisen Sie es, wenn nein, geben Sie ein einfaches Gegeneispiel an.

**Lösung:**Nein. Nicht wenn  $\vec{a} = 0 \rightarrow \vec{b}, \vec{c}$  beliebig**HS15 - Aufgabe 1d)**

Die Vektoren  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  seien definiert als  $\vec{e}_1 := (1, 0, 0)$  und  $\vec{e}_2 := (0, 2, 0)$ . Welchen Vektor erhält man, wenn man das Kreuzprodukt von  $\vec{e}_1$  und  $\vec{e}_2$  bildet und den resultierenden Vektor noch um den Faktor 2 streckt?

**Lösung:**

(0, 0, 4)

**Rep-HS14 - Aufgabe 1a)**

Für welche zwei Vektoren  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  gelte:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2\sqrt{2}$ ,  $|\vec{a}||\vec{b}| = 4$ . Geben Sie den kleineren Zwischenwinkel an. Geben Sie auch ein konkretes Beispiel von  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  mit Koordinaten an.

**Lösung:** $\frac{\pi}{4}$  oder  $45^\circ$  Bsp.:  $\vec{a} = (2, 0), \vec{b} = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ **Rep-HS14 - Aufgabe 2:**

Da Sie ohne Taschenrechner arbeiten, können Sie einzelne Ausdrücke in dieser Aufgabe auch unausgerechnet stehen lassen. Gegeben sei der Punkt  $A(1, 3, 4)$ .

- Welche beiden Punkte  $B, C$  auf der  $x$ -Achse haben genau Abstand  $\sqrt{50}$  von  $A$ ?
- Geben Sie einen Normalenvektor zur Ebene durch die Punkte  $A, B, C$  an.
- Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks mit Ecken  $A, B, C$ .

**Lösung:**a)  $B = (-4, 0, 0), C = (6, 0, 0)$  b)  $\vec{n} = (0, -40, 30)^T$  c) 25**HS14 - Aufgabe 1.1) - 1.3)**

- Sei  $g$  eine Gerade, welche durch die beiden Punkte  $A(1, 2, 3)$  und  $B(4, 5, 6)$  geht. In welchem Punkt  $C$  durchsticht diese Gerade die  $x$ - $y$ -Ebene?
- Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks  $A(0, 0, 0), B(1, 1, 1), C(5, 0, 2)$ .
- Ist das Vektorprodukt kommutativ? Wenn ja, beweisen Sie es; wenn nein, rechnen Sie ein einfaches Gegenbeispiel dazu.

**Lösung:**

1)  $C = (-2, -1, 0)$  2)  $\frac{\sqrt{38}}{2}$  3)  $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$   
 z.B.  $\vec{a} = (1 \ 0 \ 0)$  und  $\vec{b} = (0 \ 1 \ 0) \rightarrow (0 \ 0 \ 1) \neq (0 \ 0 \ -1)$

**Rep-HS13 - Aufgabe 2 :** Wir legen durch die drei Punkte  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  und  $(0, 0, 1)$  eine Ebene.

- a) Machen Sie dazu eine Skizze und geben Sie einen Normalenvektor der Länge 1 zur Ebene an (Herleitung wegen schöner Zahlen und Skizze nicht nötig).
- b) Geben Sie noch einen zweiten, anderen Normalenvektor der Länge 1 zur Ebene an.
- c) Wie sieht die Ebenengleichung aus?
- d) Welche Winkel hat die Ebene zur  $x$ - $y$ -Ebene? [Es ist nicht 45!; sie können den trigonometrischen Ausdruck stehen lassen]

**Lösung:**

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \vec{n} = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) & \text{b) } \vec{n}_2 = \left( -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ \text{c) } x + y + z - 1 = 0 & \text{d) } \alpha = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \arcsin\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \end{array}$$

**Probeprüfung HS12 - Aufgabe 2:**

Geben Sie alle Punkte auf der  $y$ -Achse an, von denen man die beiden Punkte  $A(2; 3; 1)$  und  $B(4;-4; 2)$  unter einem rechten Winkel sieht.

**Lösung:**

$$(0, -2, 0) \text{ und } (0, 1, 0)$$

**HS12 - Aufgabe 2:**

Wie lautet die Gleichung der Ebene, welche durch die drei Punkte  $A(0,0,1)$ ,  $B(0,1,0)$  und  $C(1,0,0)$  geht?

**Lösung:**

$$x + y + z - 1 = 0$$